

खोरत रोग घुर फडा जनावरहरूमा लाग्ने भयानक संक्रामक सरुवा रोग हो । यो रोग नेपालको पूर्व मेष देखि पशुचमको महाकाली सम्मको तराइको विभिन्न पशुभाग देखि मध्य तथा उच्च पहाडी भाग सम्म फैलन सक्ने र पशुहरूमा ठूलो हानि नोक्सानि पुऱ्याई कृषकको लाखाँको भति पुऱ्याउने रोग हो । यो रोग विषाणु Virus बाट हुने भयानक सरुवा रोग हो । यो रोग विशेष गरि गाई-भैसी-बेडा-बाखा, तथा बंगुरहरूमा बारम्बार देखा परिरहने गर्दछ । स्थानिय बसक गाई-भैसीमा खोरत रोग व्यापक रूपमा देखापरेता पनि यसै रोगको कारणले मृत्यु भने कसै हुने गर्दछ । तर साना बाच्छा-बाच्छी-पाडा-पाडी तथा बंगुरका पाडा, पाठीमा भने अत्यधिक मृत्युर बढी हुने देखिन्छ । यो रोग लागेमा दुधालु गाई/भैसीहरूको दुध ज्यादैँ चाडो घट्दै जाने र लामो समय सम्म यसको नकारात्मक असर भने रहि रहन्छ । व्याउने गाई, भैसी प्राय तहिल्छ र भाले जनावर जस्तै गोरू महिनी सम्म जोत्न तथा गाडा ताल्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छ । यो रोग विशेषगरि उन्नत नशलका पशुहरूमा बढी असर र मृत्युर पनि बढी हुने देखिएको छ ।

❖ कारण (Etiology) विषाणु Virus बाट लाग्ने यो रोग विभिन्न प्रकारका विषाणु Virus बाट लाग्ने गर्दछ । हाप्रो देशमा O-A-Asia 1 जस्ता जातका खोरत विषाणु रोग फैलाउन विशेष सकृय भएको पाइन्छ । यो रोग लागेका भण्डै ५० प्रतिशत गाई, भैसी, बेडा, बाखाले रोगको विषाणु लामो समय सम्म आफ्नो शरिरमा पालिरहन सक्छन् । हाप्रो जस्तो मुलुकमा विशेषगरि गाई, भैसी, खरिस, बोका र सुगुरहरूको अनियन्त्रित आंशार-प्रसार, खेतीको समयमा गोरू, रोगको आवत-जावतको कारण सक्रियत जनावर सगको सर्पक बेहदने हुनाले रोग सर्ने गरेको पाइएको छ ।

❖ लक्षण (Symptoms) :

- निम्नानुशार लक्षणहरू देखिन्छन :
- शुरुमा रोग लागेको पशु भोकिने, खाना खान मन नगर्ने, दूध उत्पादन एकसाँस घट्ने ।
  - मुख भित्र विभिरा जस्ता ससाना फोका आउदछन

जसका कारण मुखबाट च्याल तप तप

चुलाइराउलछ ।

➤ शारिरिक तापक्रम १०४.१०६ डिग्री फरेन हाइट

सम्म ज्वरो आउदछ ।

➤ यसरी मुख भित्र र बाहिर विभिरा निकि सकेपछी

ज्वरो कमस घटतछ ।

➤ मुख भित्रका फोकाहरू फुटेर पातलो भिल्ली

उत्किर रातो अल्सर जस्ता भै दाना, घाँस पात

आदि किल्लो उत्किएको भागमा टासिएर दुख्ने भै

पशुले खान नसक्ने र च्याल भने बगाइरहने हुन्छ ।

➤ मुखमा घाउ देखापरेको ३४ दिनमा घुरको कापमा

समेत विषाणुको संक्रमण हुन भै घाउ खटिराहरू

देखापरे पाकत थाल्छ र फोका फुटेपछि पिप बग्ने,

गन्हाउने र किरा समेत पर्ने हुन्छ ।

➤ घुन तथा कल्चोडामा समेत विभिरा निस्कन भै

दुधालु पशुहरूमा घुनेलो समेत हुने गर्दछ ।

➤ यो रोगले माउ भन्दा बच्चालाई बढी असर

पुऱ्याउदछ ।

➤ व्याउने माउहरूले गर्भ तुहाउने हुन सक्छ ।

❖ उपचार (Treatment)

यो रोगको खासै उपचार छैन तर लक्षणका आधारमा

उपचार गरिदा हानि नोक्सानिबाट बचाउन सकिन्छ ।

➤ १ प्रतिशत को Alum+ Borex को मनतातो

भोलले मुख सफा गर्ने ।

➤ २ प्रतिशतको बोरिक एसिडको भोलले घुन तथा

कल्चोडा सफा गरि बेटाडिन मलहम आंशानो

पाएर लगाइदिने ।

➤ खुश तथा मुखको घाउलाई चाडो निको पार्ने

सल्फाडिमाइडिन वा एण्टिबायोटिक्स को रूपमा

२०४० यूनिट सम्म स्ट्रेप्टोपेनिशिलिन वा २२.५

ग्राम सम्मको एम्पिशिलिन+क्लोक्जेशिलिन ५७

दिन सम्म मासुमा सुई दिने ।

जिट- एभिल र दुखाइ कम गर्ने सुइ १०१२

एम.एलका ढरले मासुमा सुइ दिने ।

➤ यदि घाउमा किरा परेको भएमा खुशको घाउमा

मनतातो पानीमा पोटास राखि सफा गर्ने र किरा

मार्न तारिपनको तेल घाउमा राख्ने र सो टाउमा

मलहम (हिमेक्स) घाउमा लगाउने ।

रोकथाम (Prevention) :

- रोगी जनावरलाई तुरुन्त बथानबाट अलगगारे
- रालुको साथै बरनमा लैजाउनु हुदैन ।
- खारेत रोग लागेको माउको दूध पाडा वाच्छालाई खुवाउनु हुदैन ।
- मुखका घाउलाई असर नपुनेखालका खानेकुरा जस्तै खोले, भातको माड जस्ता नरमखालका खाना दिनु पर्दछ ।
- खारेत खोप नलगाएको पशु हाटबजारमा नलैजाने ।
- खारेत विरुद्धको खोप फैलिरहने स्थानमा अनिवार्य रूपमा बर्को २ पटक लगाउनु पर्दछ । यो रोग हावाबाट पनि सर्ने सक्ने भएकाले खार-गोटको विशेष व्यवस्था भित्राउनु पर्दछ ।
- गोठ, खार बरिपरि फिनेल पानी छर्कनु पर्दछ ।
- भरेको पशुलाई गहिरो खाडल खाने गोडनु पर्दछ ।
- विदेश वा अन्य फामबाट पशु किनेर ल्याउदा अनिवार्य रूपमा खोप लगाई ३ हप्ता पछि मात्र आफ्नो गोठमा ल्याउनु पर्दछ ।
- खारेत रोग लागेको क्षेत्र बरिपरि Ring Vaccination गर्नु पर्दछ ।
- यो रोग लागेको थाला पाउना साथ तुरुन्त स्थानिय तहको पशु सेवा शाखा वा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा जानकारि गराउने र निबन्धन तर्फ उन्मुख हुनु पर्दछ ।

## पशुहरूमा लाग्ने खारेत रोग Foot and Mouth Disease



प्रदेश सरकार  
पशुपक्षी तथा जलस्य विकास निर्देशनालय

प्रदेश नं.१ बिराटनगर  
फोन नं. ०२१-४५०६२४  
इमेल ftdor@gmail.com